

Calendário Nacional de Vacinação - 2018

IDADE	VACINA	PASSADO VACINAL	CONDUTA
Menores de 10 anos de idade	Ao nascimento	BCG ¹ + Hepatite B ²	-
	2 meses	VIP + Rotavírus + Pentavalente ³ + Pneumo 10	-
	3 meses	Meningo C Conjugada	-
	4 meses	VIP + Rotavírus + Pentavalente ³ + Pneumo 10	-
	5 meses	Meningo C Conjugada	-
	6 meses	VIP + Pentavalente ³	-
	9 meses	Febre Amarela	-
	12 meses	Triviral (SRC) + Pneumo 10 + Meningo C ⁴	-
	15 meses	Tetraviral (SRCV) ⁵ + VOP ⁶ + DTP + Hepatite A	-
	4 anos	DTP + VOP + Varicela ⁷	-
	< 5 anos	Influenza na sazonalidade	-
9 anos	HPV (meninas)	-	
Vacinação entre 10 e 29 anos de idade	Hepatite B	Não vacinado	3 doses
		Menos de 3 doses	Completar 3 doses
		3 doses	Considerar vacinado
	Dupla Adulto (dT)	3 ou + de Penta, Tetra, DTP, DTPa ou dT	Reforço, se última dose há mais de 10 anos
		Menos de 3 doses	Completar 3 doses
		Não vacinado ou ignorado	3 doses
	Triplíce Viral	Não vacinado	2 doses
		1 dose	1 dose
		2 doses	Considerar vacinado
	Febre Amarela	Não vacinado	1 dose
		1 dose ou mais	Considerar vacinado
9 - 14 anos	Vacina HPV Quadrivalente	Meninas	2 doses
11 - 14 anos		Meninos	2 doses
11 - 14 anos	Meningo C Conjugada	-	1 dose
Vacinação entre 30 e 59 anos de idade	Hepatite B	Não vacinado	3 doses
		Menos de 3 doses	Completar 3 doses
		3 doses	Considerar vacinado
	Dupla Adulto (dT)	3 ou + de toxóide tetânico	Reforço, se última dose há mais de 10 anos
		Menos de 3 doses	Completar 3 doses
		Não vacinado ou ignorado	3 doses
	Triplíce Viral	Não vacinado	1 dose (até 49 anos de idade)
		1 dose	Considerar vacinado
Febre Amarela	Não vacinado	1 dose	
	1 dose ou mais	Considerar vacinado	
Vacinação a partir dos 60 anos de idade	Hepatite B	Não vacinado	3 doses
		Menos de 3 doses	Completar 3 doses
		3 doses	Considerar vacinado
	Dupla Adulto (dT)	3 doses ou mais de toxóide tetânico	Reforço, se última dose há mais de 10 anos
		Menos de 3 doses	Completar 3 doses
	Febre Amarela ⁸	Não vacinado	1 dose
	Pneumo 23	-	Vacinar acamados e residentes em ambientes coletivos
Influenza	-	Vacinar na sazonalidade	

1. BCG: Não aplicada após cinco anos completos, exceto contatos de hanseníase.
2. Hepatite B: A dose isolada da Hepatite B é desnecessária após um mês de idade, sendo suficientes as três doses de Pentavalente.
3. Pentavalente: DTP + Haemophilus b + Hepatite B.
4. Reforço Pneumo 10 e Meningo C e Dose única de Hepatite A administrar até 4 anos, 11 meses e 29 dias.
5. Tetraviral: Aplicar somente se a criança já recebeu a primeira dose(D1) de Triplíce viral.
6. VOP (Vacina Oral Poliomeélite): só deve ser administrada após três doses de VIP (Vacina Inativada Poliomeélite).
7. Varicela (2ª dose): deverá ser administrada até 6 anos, 11 meses e 29 dias.
8. Febre Amarela: Só deverá ser administrada após avaliação das contra-indicações pelos profissionais de saúde.

OBS: Casos especiais: encaminhar ao Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais.

PRINCIPAIS CONTRAINDICAÇÕES ÀS VACINAS	
VACINA	CONTRAINDICAÇÕES
BCG	- Lesões dermatológicas generalizadas - Imunodeficiências - Peso inferior a 2 Kg
Hepatite B	Evento adverso grave à dose anterior
Meningo C Conjugada	Evento adverso grave à dose anterior
Pólio Oral	Imunodeficiências e contato íntimo com imunodeficientes
DTP	- Cardiopatia congênita - Evento adverso grave à dose anterior - Doença neurológica não controlada - Maiores que 7 anos
Haemophilus B	Evento adverso grave à dose anterior
Rotavírus	- Imunodeficiências - Doenças congênitas gastrointestinais - Histórico de invaginação intestinal - Limites de idade
Pneumo 10	Evento adverso grave à dose anterior
Febre Amarela	- Imunodeficiências - Doenças do timo - Doenças autoimunes - Alergia grave a ovo - Gravidez
Triviral	- Imunodeficiências - Gravidez - Púrpura associada à dose anterior
Influenza	- Alergia grave a ovo - Idade inferior a seis meses
Hepatite A	Evento adverso grave à dose anterior
HPV	- Evento adverso grave à dose anterior - Gravidez
Varicela	- Imunodeficiências - Uso crônico de ácido acetilsalicílico - Gravidez
Tetraviral	- Maior de 12 anos - Vide Triviral e Varicela

Assessoria: Dr. José Geraldo Leite Ribeiro

VACINA INFLUENZA

Feita uma dose anualmente nas idades e situações recomendadas pelo PNI. Geralmente:

- Gestantes: qualquer idade gestacional, puérperas (até 45 dias pós-parto);
- Menores de 5 anos de idade, a partir dos 6 meses;
- Maiores de 60 anos de idade;
- Grupos especiais.

VACINAÇÃO DE GESTANTES

- **Vacina Influenza:** uma dose em toda gestação, qualquer idade gestacional.
- **Vacina dTpa:** uma dose em toda gestação, a partir de 20 semanas.
- **Vacina Hepatite B:** qualquer idade gestacional. 3 doses no passado: vacinada; Menos de 3 doses: completar 3.